

گلو درد چرکی چیست ؟

گلو درد چرکی عفونت گلو و لوزه ها توسط باکتریهای از نوع استرپتوکوک می باشد که به نام گلو درد نوع استرپتوکوکی شناخته می شود .

نشانه های گلو درد چرکی چیست ؟

- ۱- گلو درد و سوزش در ناحیه گلو به خصوص در هنگام قورت دادن غذا
 - ۲- تب
 - ۳- تورم و دردناک شدن غدد لنفاوی در ناحیه گردن
 - ۴- احساس خستگی و کوفتگی بدن
 - ۵- لوزه ها متورم شده و اغلب با نقاط چرکی پوشیده می شوند .
 - ۶- ناحیه سقف دهان قرمز رنگ و ملتهب می شوند .
- * توجه : سرفه ، گرفتگی صدا، آبریزش بینی از نشانه های گلو درد چرکی نبوده و بیشتر ویروسی می باشد .

نحوه انتقال گلودرد چرکی چیست ؟

انتقال عفونت استرپتوکوکی از طریق ریز قطرات ، هنگام عطسه و سرفه فرد دارای گلو درد چرکی صورت می گیرد.



مدت زمان دوره کمون (دوره پنهان) چه مدت می باشد ؟

دوره کمون (از زمانی که عفونت وارد بدن می شود تا زمانیکه علائم دیده می شود) این بیماری ۱-۳ روز می باشد .

جهت تشخیص نوع استرپتوکوک از گلو یک نمونه کشت گرفته می شود .

بعد از ۲ روز جواب قطعی کشت آماده می شود .

درمان گلودرد چرکی نوع استرپتوکوکی چیست ؟

۱- درمان یا به صورت تزریقی و یا به صورت خوراکی است .

اگر درمان بصورت تزریقی باشد یک دوز پنی سیلین تزریقی و در صورت درمان به صورت خوراکی به مدت ۱۰ روز پنی سیلین خوراکی تجویز می شود .

طول مدت بیماری گلو درد چرکی چند روز می باشد ؟

در صورت مصرف آنتی بیوتیک، ۲۴ ساعت بعد از شروع مصرف آنتی بیوتیک، علائم کاهش می یابد .

اما در صورتی که آنتی بیوتیک جهت بیمار شروع نشود علائم ممکن است چند هفته طول بکشد .

قابل توجه والدین محترم : در صورت بروز گلو درد در کودکان تا ۲۴ ساعت از رفتن به مدرسه خودداری شود.

در صورتی که درمان گلو درد چرکی به صورت ناقص و یا درمان با آنتی بیوتیک انجام نشود عواقب آن چه می باشد ؟

۱- تب روماتیسمی

۲- آسیب به کلیه ها

۳- آسیب به قلب

تب روماتیسمی چیست ؟

تب روماتیسمی یک مشکل بسیار جدی است که می تواند به دنبال درمان نامناسب گلو درد چرکی و یا عدم دریافت آنتی بیوتیک ایجاد گردد .

تب روماتیسمی معمولاً ۲-۵ هفته بعد از عفونت گلو ایجاد می شود .

علائم تب روماتیسمی شامل نشانه های زیر می باشد :

۱- نارسایی دریاچه های قلب

۲- درد و تورم مفاصل

۳- حرکات غیر ارادی بدن

۴- تب

باسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بیمارستان قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی

کد: ۰۳-۰۳-PA-EP

گلو درد چرکی



تهیه کننده: الهام تراب زاده سرپرستار بخش سی سی یو ۱
ناظر کیفی: آرزو چایچی کارشناس ارشد پرستاری

تابستان ۱۴۰۰



می باشد. دارو را طبق دستور پزشک و سر ساعت مشخص شده مصرف کنید. اگر علائم بیمار شما در ابتدای درمان بهبود یافت طول مدت درمان را کامل کنید.

۴- در صورتی که پزشک تشخیص دهد عامل ایجاد گلو درد ویروسی است نیاز به درمان با آنتی بیوتیک نمی باشد. لذا جهت جلوگیری از مقاومت میکروبی به پزشک پیشنهاد تجویز آنتی بیوتیک ننمائید.

۵- افرادی که دچار تب روماتیسمی شده اند باید جهت پیشگیری از مشکلات بعدی تا ۴۰ سالگی و یا تا پایان عمر طبق نظر پزشک به صورت دوره های مشخص از آنتی بیوتیک ها استفاده نمایند.

منابع:

[www . printo . it](http://www.printo.it)

[www . dhs . wisconsin . gov](http://www.dhs.wisconsin.gov)

[http ://en . Wikipedia . org](http://en.Wikipedia.org)

۵- راشهای پوستی

آسیب به کلیه ها چگونه است؟

از عوارض دیگر گلو درد چرکی صدمه به کلیه ها می باشد که این مشکل ۱۰ روز بعد از عفونت استرپتوکوکی درمان نشده خود را نشان می دهد که ممکن است به نارسایی موقت و یا دائم کلیه بینجامد.

نشانه های آن شامل:

۱- کاهش میزان ادرار

۲- ادرار تیره رنگ

۳- ورم خفیف اطراف چشم ها

۴- خستگی

چگونه از عوارض عفونت استرپتوکوکی جلوگیری

نماییم؟

۱- جهت تشخیص به پزشک مراجعه نموده و از خود درمانی بپرهیزید.

۲- در صورت تجویز آنتی بیوتیک تزریقی قبل از تزریق حتماً تست پنی سیلین انجام دهید.

نکته: در صورت سابقه ی حساسیت به پنی سیلین حتماً به پزشک معالج خود اطلاع دهید.

۳- توجه داشته باشید در صورتیکه از آنتی بیوتیکهای خوراکی استفاده می کنید طول مدت درمان ۱۰ روز