

آمیودارون دارویی است که برای جلوگیری و درمان انواع خاصی از بی نظمی های ضربان قلب استفاده می شود .

### نحوه جذب و دفع :

اثر آن تقریباً ۲روز تا ۳ هفته پس از اولین مصرف شروع می شود و اثر درمانی ۱ هفته تا ۵ ماه بعد از شروع مصرف حاصل می گردد . بعد از قطع درمان در کودکان تا چند هفته و در بزرگسالان تا چند ماه اثر دارو ادامه دارد . این دارو از طریق گوارش جذب شده و در کبد تجزیه و با مدفوع دفع می شود .

### شکلهای قابل دسترس :

این دارو به صورت قرص های ۴۰۰ و ۲۰۰ میلی گرمی و آمپولهای ۱۵۰ میلی گرمی می باشد .

### عوارض جانبی :

به ترتیب عوارض شایع تر : یبوست ، حالت تهوع ، احساس افت انرژی و خستگی ، دل درد ، سر درد ،

مشکل در به خواب رفتن ، احساس گر گرفتگی ، تغییر در حس چشایی و بویایی ، افزایش بزاق ، کاهش اشتها عوارض جانبی نادر اما جدی ( در صورت بروز این علائم هر چه سریع تر با پزشک مشورت کنید :

- مشکلات کبدی : ادرار تیره همراه با خستگی ، کم اشتهایی ، تهوع ، دل درد و مدفوع رنگ روشن و پوست زرد
- مشکلات ریه : مشکل در تنفس ، تنگی نفس ، سرفه ای که جدید باشد یا بدتر شده باشد .
- مشکلات تیروئید : تغییر وزن بدون تلاش ، اضطراب ، بی قراری ، ورم گردن ، ریزش مو ، افسردگی
- استیون جانسون : پوست قرمز ، متورم ، ایجاد تاول ، پوسته پوسته شدن ، چشم قرمز ، زخم دهانی
- عوارض نادر و جدی : عدم تعادل ، لرزش ، آفتاب سوختگی ، تغییر رنگ پوست ( آبی خاکستری ) ، احساس بی حسی یا گز گز ، درد چشم

### نکاتی که زمان مصرف این دارو باید مورد توجه قرار گیرد :

- از پرستار خود بخواهید چگونه اندازه گیری تعداد نبض را به شما بیاموزد و در صورت داشتن تعداد نبض کمتر از ۶۰ تا در طول ۱ دقیقه به پزشک خود اطلاع دهید .

- ممکن است در اثر مصرف دارو لکه هایی روی پوست یا قرنیه چشم شما به وجود بیاید که ممکن است ۷-۱ ماه طول بکشد . توجه داشته باشید لکه های ایجاد شده روی چشم شما روی قدرت بینایی شما تاثیر منفی ندارد . در صورت درد چشم ، تغییرات بینایی ، حساسیت شدید به نور و خارش و تحریک شدید چشم به پزشک مراجعه کنید .

- به صورت دوره ای طبق نظر پزشک خود برای چک فعالیت کبد ، ریه ها ، تیروئید ، چشم ، اعصاب و دستگاه گوارش خود به پزشک مراجعه کنید .



## بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

(( آموزش ضمن خدمت ))

شماره پمفلت: ۰۶ - ۰۲ - PA- EP

### آمیودارون

تهیه کننده: پروانه زارع، سرپرستار بخش p.ccu  
تایید کننده: آرزو چایچی - کارشناس ارشد پرستاری  
ناظر کیفی: دکتر مرجان علیپور - دارو ساز

منابع:

- داروهای ژنریک ایران ترجمه محمد آنگون
- Nursing drug reference 2018
- www . wikiped: a . com

زمستان ۱۴۰۰



آدرس الکترونیکی بیمارستان

[www.hfhc.sums.ac.ir](http://www.hfhc.sums.ac.ir)

- در صورت بروز هر گونه عدم تعادل و اشکال در راه رفتن حتماً به پزشک خود مراجعه کنید .

- جهت تحمل بهتر عوارض گوارشی ترجیحاً همراه با غذا میل شود . بهتر است دارو در ساعات مشخص و همزمان با غذا ( خصوصاً در کودکان ) مصرف شود .

- این دارو در زمان شیر دهی منع مصرف دارد .

- جهت کاهش عوارض دارو از عینک آفتابی تیره و کلاه نقاب دار و کرم ضد آفتاب استفاده کنید .

- در طول روز در معرض آفتاب شدید در طولانی مدت قرار نگیرید