

پلاویکس چیست؟

پلاویکس یک داروی ضد تجمع پلاکتی است که خطر بروز مجدد سکنه مغزی، حمله قلبی را کاهش می‌دهد. هر قرص پلاویکس حاوی ۷۵ میلی گرم از ماده ای به نام کلوپیدگرل می باشد.

پلاویکس برای چه کسانی مصرف می شود:

پلاویکس جهت جلوگیری از انسداد مجدد عروق و تشکیل لخته در افرادی که مبتلا به بیماری گرفتگی رگ‌های قلب هستند و یا تحت عمل آنژیوپلاستی (کارگذاری استنت) قرار گرفته اند، استفاده می شود.

چه کسانی نباید پلاویکس مصرف کنند؟

افرادی که:

- به دارو حساسیت داشته باشند.
- از بیماری شدید کبدی رنج می برند.
- خونریزی فعال مانند زخم معده یا خونریزی داخل مغزی داشته باشند.
- در دوران شیر دهی باشند.

قبل از شروع داروی پلاویکس به پزشک اطلاع

دهید اگر:

- اخیراً آسیب جدی دیده‌اید. (مانند تصادف یا ضربه و صدمات شدید)
- اخیراً عمل جراحی کرده‌اید یا دو هفته آینده عمل جراحی در پیش دارید.
- به بیماری کلیه یا کبد یا بیماری‌های خونی مبتلا هستید.

چگونه پلاویکس را مصرف کنیم؟

- دارو را طبق دستور پزشک استفاده کنید.
- هرگز دارو را به میزان بیشتر یا زمان طولانی تر از دستور پزشک مصرف نکنید.
- می‌توانید دارو را همراه غذا یا با معده خالی مصرف نمایید.
- دارو را با یک لیوان پر از آب مصرف کنید.

در زمان مصرف پلاویکس از انجام چه کارهایی

باید اجتناب کرد؟

- از نوشیدن الکل اجتناب کنید زیرا الکل خطر خونریزی معده یا روده را افزایش می دهد.
- از انجام ورزش‌های سنگین که می‌تواند منجر به آسیب‌های خونریزی دهنده شود، بپرهیزید.
- در هنگام مسواک زدن و تراشیدن موهای صورت و بدن مراقب باشید.
- از مصرف آسپرین و دیگر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند ناپروکسن، دیکلوفناک، ایبوپروفن، پیروکسیکام، مفنامیک اسید بدون مشورت پزشک اجتناب کنید.
- در صورت نیاز به دندانپزشک یا جراحی حتماً به دندانپزشک یا جراح مربوطه در رابطه با مصرف این دارو اطلاع دهید. ممکن است نیاز باشد که دارو حداقل ۵ روز قبل از جراحی قطع شود.

باسمه تعالی



بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی

((آموزش ضمن خدمت))

کد : ۲۲-۰۳ - EP - PA

پلاویکس (کلویپیدوگرل)



تهیه کننده: ریحانه شیدایی سوپروایزر بالینی

ناظر کیفی: آرزو چایچی - کارشناس ارشد پرستاری

بهار ۱۴۰۰



در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو

چه اقداماتی باید انجام داد ؟

در صورت فراموش کردن یک دوز دارو اگر تا زمان مصرف دوز بعدی دارو ، بیشتر از ۱۲ ساعت مانده بود دارو را مصرف کنید . ولی اگر تا زمان مصرف دوز بعدی کمتر از ۱۲ ساعت مانده بود فقط داروی نوبت بعدی را در زمان معمول خود استفاده کنید .

توجه داشته باشید هیچگاه برای جبران عدم

مصرف دارو، مقدار آن را دو برابر نکنید.

منابع :

www. Drug . com/plavix ۲۰۲۰

PDR Nurse drug handbook
cardiovascular ۲۰۱۷

آدرس الکترونیکی بیمارستان

WWW.hfmc.sums.ac.ir

چه اثرات نامطلوبی ممکن است پلاویکس ایجاد

کند :

در صورت مشاهده عوارض جانبی شدید زیر دارو را قطع و به پزشک اطلاع دهید .

- کهیر ، ورم صورت ، لبها ، زبان ، گلو
- خونریزی از بینی ، مدفوع خونی یا سیاهرنگ ، خون در ادرار یا ادرار تیره، خونریزی زیر پوستی یا کبودی پوست .
- احساس سنگینی و درد در قفسه سینه که به بازو یا شانه کشیده می شود .
- احساس گیجی ، سر درد ، مشکل در بینایی ، عدم تعادل
- احساس ضعف رنگ پریدگی و بی حالی
- اسهال

در صورت مشاهده عوارض جانبی خفیف زیر دارو را

ادامه داده و به پزشکتان اطلاع دهید :

- درد معده
- سر درد ، گیجی خفیف
- آبریزش بینی ، گرفتگی بینی ، گلو درد ، سرفه